

**Corrigé du bac général 2026**  
**Classe de première**  
**Mathématiques Spécialité**  
**Sujet zéro 1**

**BACCALAURÉAT GÉNÉRAL**

**ÉPREUVE ANTICIPÉE**

**SESSION 2026**

**MATHÉMATIQUES**

Candidats suivant l'enseignement de spécialité de mathématiques

Durée de l'épreuve : 2 heures

*L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé*

Correction proposée par un professeur de mathématiques pour le site [sujetdebac.fr](http://sujetdebac.fr)

Pour accéder à d'autres sujets et corrigés de maths spé (1<sup>ère</sup>) au baccalauréat :  
[www.sujetdebac.fr/Annales/mathematiques-spe-premiere/](http://www.sujetdebac.fr/Annales/mathematiques-spe-premiere/)

## AUTOMATISMES – QCM (6 points)

### Question 1 : réponse b

Le « double de 5 » vaut 10, et son inverse vaut  $\frac{1}{10}$

### Question 2 : réponse a

$$cd = 4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) = -1$$

$$\frac{b}{cd} = \frac{3}{-1} = -3$$

$$\text{Donc } F = a - 3 = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$$

### Question 3 : réponse a

Multiplier un prix par 0,975 revient à le multiplier par  $(1 - 0,025)$ .

C'est donc une baisse de 2,5%.

### Question 4 : réponse c

Partons d'un exemple avec un prix de départ à 100€.

$$\text{Augmentation de 10\% : } 100 + \left(100 \times \frac{10}{100}\right) = 110$$

$$\text{Puis baisse de 10\% : } 110 - \left(110 \times \frac{10}{100}\right) = 99$$

Le prix final (99€) est plus petit que le prix initial (100€).

### Question 5 : réponse a

La somme des probabilités doit être égale à 1 :

$$0,5 + \frac{1}{6} + 0,2 + x = 1$$

$$\Rightarrow x = 1 - \left(0,5 + \frac{1}{6} + 0,2\right) = 1 - \left(\frac{15}{30} + \frac{5}{30} + \frac{6}{30}\right) = 1 - \frac{26}{30} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$$

### Question 6 : réponse a

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{u}$$

$$\Rightarrow \frac{y}{xy} + \frac{x}{xy} = \frac{x+y}{xy} = \frac{1}{u}$$

$$\Rightarrow u = \frac{xy}{x+y}$$

**Question 7 : réponse b**

$$x^2 \geq 10 \Rightarrow x \leq -\sqrt{10} \text{ ou } x \geq \sqrt{10}$$

**Question 8 : réponse d**

Une méthode simple est d'utiliser deux points de la courbe et de vérifier les équations de droite. On vérifie l'équation d :

$$\text{Avec le point } (0; 2) : \frac{0}{3} + \frac{y}{2} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow y = 2$$

$$\text{Avec le point } (3; 0) : \frac{3}{3} + \frac{y}{2} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{y}{2} = 0 \Rightarrow y = 0$$

**Question 9 : réponse b**

On vérifie que chaque expression développée est bien de type  $ax + b$  :

- $f_1(x) = x^2 - (1 - x)^2 = x^2 - (1 - 2x + x^2) = 2x - 1 \rightarrow$  affine
- $f_2(x) = \frac{x}{2} - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}x + \left(-1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \rightarrow$  affine
- $f_3(x) = \frac{5 - \frac{2}{3}x}{0,7} = \frac{-\frac{2}{3}}{0,7}x + \frac{5}{0,7} \rightarrow$  affine

**Question 10 : réponse c**

Il faut reconnaître le sens d'ouverture et le sommet de la parabole sur la figure.

- a.  $x \mapsto x^2 - 10$  : ouvre vers le haut, sommet  $(0; -10)$
- b.  $x \mapsto -x^2 - 10$  : ouvre vers le bas, sommet  $(0; -10)$
- c.  $x \mapsto -x^2 + 10$  : ouvre vers le bas, sommet  $(0; 10)$
- d.  $x \mapsto -x^2 + 10x$  : ouvre vers le bas, et passe par  $(0; 0)$  car il n'y a pas de terme constant.

**Question 11 : réponse b**

Pour que le produit  $x \times f(x)$  soit positif, il faut que  $x$  et  $f(x)$  soit du même signe.

Par lecture graphique, on trouve :

$$x_R > 0 \text{ et } f(x_R) > 0$$

$$x_A < 0 \text{ et } f(x_A) < 0$$

**Question 12 : réponse d**

$$\text{Moyenne pondérée : } m = \frac{10 \cdot 1 + 8 \cdot 2 + 16 \cdot x}{1 + 2 + x} = \frac{26 + 16x}{3 + x}$$

On impose  $m = 15$  :

$$\frac{26 + 16x}{3 + x} = 15$$

$$\Leftrightarrow 26 + 16x = 15(3 + x) = 45 + 15x$$

$$\Leftrightarrow 16x - 15x = 45 - 26$$

$$\Leftrightarrow x = 19$$

### EXERCICE 1 (X points)

1.a

$$\overrightarrow{OI} = (4 - 0, 3 - 0) = (4, 3)$$

$$\overrightarrow{OC} = (0 - 0, 4 - 0) = (0, 4)$$

1.b Produit scalaire (par coordonnées) :

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = 4 \times 0 + 3 \times 4 = 12$$

2.a Comme  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(OI)$ , la projection de  $\overrightarrow{OC}$  sur la direction de  $\overrightarrow{OI}$  a pour longueur  $OH$ . Par la définition du produit scalaire :

$$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = OI \times OH$$

2.b

$$OI = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

2.c

D'après 1.b et 2.a :  $OI \times OH = 12$

Avec  $OI = 5$ , on obtient :

$$OH = \frac{12}{5} = 2,4$$

3.a  $\overrightarrow{OI} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$  est un vecteur directeur de  $(OI)$  et un vecteur normal de  $(CH)$ .

Donc une équation cartésienne de  $(CH)$  est de la forme  $4x + 3y + c = 0$ .

Or nous savons que le point  $C(0; 4)$  appartient à la droite  $(CH)$ , donc :

$$4 \times 0 + 3 \times 4 + c = 0 \quad \Leftrightarrow \quad c = -12$$

On obtient donc l'équation cartésienne de  $(CH)$  :  $4x + 3y - 12 = 0$

**3.b** Équation du cercle  $\mathcal{E}$  de centre  $D(2; 2)$  et rayon  $r = 0,5$  :

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = (0,5)^2 = 0,25$$

Développement :

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 = 0,25 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0$$

Ce qui correspond bien à l'équation annoncée dans le sujet

**3.c** On cherche si  $M(1,5; 2)$  appartient à la droite  $(CH)$  :

$$4 \times 1,5 + 3 \times 2 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0$$

Donc le point  $M(1,5; 2)$  appartient à la droite  $(CH)$ .

On cherche ensuite si  $M(1,5; 2)$  appartient au cercle  $\mathcal{E}$  :

$$\begin{aligned} 1,5^2 + 2^2 - 4 \times 1,5 - 4 \times 2 + 7,75 &= 2,25 + 4 - 6 - 8 + 7,75 \\ &= 10 - 10 = 0 \end{aligned}$$

Donc point  $M(1,5; 2)$  appartient au cercle  $\mathcal{E}$ .

Conclusion : Le point  $M$  appartient à l'intersection de  $\mathcal{E}$  et de  $(CH)$ .

## EXERCICE 2 (X points)

**1.a** On calcule le discriminant :

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9$$

Les racines sont donc :

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{9}}{2} = \frac{5 - 3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{9}}{2} = \frac{5 + 3}{2} = 4$$

Le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines car le coefficient de  $x^2$  est positif.

Donc,

- $g(x) > 0$  si  $x < 1$  ou  $x > 4$
- $g(x) = 0$  si  $x = 1$  ou  $x = 4$
- $g(x) < 0$  si  $1 < x < 4$

**1.b** Le coefficient directeur de la droite  $(A_n A_{n+1})$  est donné par :

$$a_n = \frac{g(n+1) - g(n)}{(n+1) - n} = g(n+1) - g(n)$$

Calculons  $g(n+1)$  :

$$g(n+1) = (n+1)^2 - 5(n+1) + 4 = n^2 + 2n + 1 - 5n - 5 + 4 = n^2 - 3n$$

Donc :

$$a_n = [n^2 - 3n] - [n^2 - 5n + 4] = n^2 - 3n - n^2 + 5n - 4 = 2n - 4$$

**1.c** On a montré que  $a_n = 2n - 4$ , c'est donc une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme  $a_0 = -4$ .

**2.a** On réalise le calcul :

$$f(x) = x - 5 + \frac{4}{x} = \frac{x^2 - 5x + 4}{x} = \frac{g(x)}{x}$$

C'est bien la définition de  $f(x)$  sur l'intervalle considéré.

**2.b** À l'aide de la question 1.a, déterminons la position de la courbe  $\mathcal{C}$  (celle de  $f$ ) par rapport à l'axe des abscisses.

Sur l'intervalle  $[0,5; 8]$ ,  $f(x)$  est du signe de  $g(x)$ , puisque  $x > 0$ .

Donc :

- $f(x) > 0$  si  $x < 1$  ou  $x > 4$
- $f(x) = 0$  si  $x = 1$  ou  $x = 4$
- $f(x) < 0$  si  $1 < x < 4$

Sur l'intervalle  $[0,5; 8]$ , cela donne :

- $\mathcal{C}$  est au-dessus de l'axe des abscisses sur  $[0,5 ; 1[$  et  $]4 ; 8]$ .
- $\mathcal{C}$  coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisse 1 et 4.
- $\mathcal{C}$  est en-dessous de l'axe des abscisses sur  $]1 ; 4[$ .

**2.c** Calculons la dérivée :

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$$

**2.d** Regardons le signe de la dérivée  $f'(x)$  :

Sur  $[0,5; 8]$ ,  $x + 2 > 0$  et  $x^2 > 0$ , donc le signe dépend de  $x - 2$  :

- $x - 2 < 0$  quand  $x < 2$
- $x - 2 = 0$  quand  $x = 2$
- $x - 2 > 0$  quand  $x > 2$


On obtient le tableau de variations suivant :

$x$	0,5	2	8
$x - 2$	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+
$f$	3,5	-1	3,5

Calculs des valeurs aux bornes et au minimum :

- $f(0,5) = 0,5 - 5 + \frac{4}{0,5} = 0,5 - 5 + 8 = 3,5$
- $f(2) = 2 - 5 + \frac{4}{2} = 2 - 5 + 2 = -1$
- $f(8) = 8 - 5 + \frac{4}{8} = 3 + 0,5 = 3,5$

**2.e** Allure de la courbe  $\mathcal{C}$  :



Pour accéder à d'autres sujets et corrigés de maths spé (1<sup>ère</sup>) au baccalauréat :  
[www.sujetdebac.fr/Annales/mathematiques-spe-premiere/](http://www.sujetdebac.fr/Annales/mathematiques-spe-premiere/)